

「固殺草」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 7 月 15 日農防字第 1101489465A 號公告修正

13.5% 固殺草 溶液 (SL)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
甘藍	雜草	3-5 公 升	600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
茄科小 葉菜類	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
蔥	雜草	3-5 公 升	600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
馬鈴薯	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
金針	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
茄科果 菜類	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
甜椒	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					1. 不可噴 及作 物，以 免發生 藥害。 2. 防除對 象：小 葉碎米 薺、鵝 兒腸、 通泉 草、牛 筋草、 馬齒 莧、野 莧。	
胡瓜	雜草	3-5 公 升	600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				2. 雜草密集時 可使用高劑 量。						
苦瓜	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					1. 不可噴 及作 物，以 免發生 藥害。 2. 防除對 象：馬 唐、碎 米莎 草、滿 天星、 牛筋 草、馬 齒莧。	
絲瓜	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					1. 不可噴 及作 物，以 免發生 藥害。 2. 防除對 象：馬 唐、碎 米莎 草、滿 天星、 牛筋 草、馬 齒莧。	
扁蒲	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時					1. 不可噴 及作 物，以 免發生 藥害。 2. 防除對	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				可使用高劑量。					象：馬唐、碎米莎草、滿天星、牛筋草、馬齒莧。	
瓜果類	雜草	3-5 公升	稀釋至 600 公升	1. 定植後畦面雜草高 2-5 公分時，均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：馬齒莧、芒稷、牛筋草、龍葵、野莧。	
香蕉	雜草	3-5 公升	600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：芒稷、紫花霍香薊、昭和草、碎米莎草、野莧。	
木瓜	雜草	3-5 公升	600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開					不可噴及作物，以免發	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					生藥害。	
鳳梨	雜草	3-5 公升	稀釋至 600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	
番荔枝	雜草	3-5 公升	稀釋至 600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	
酪梨	雜草	3-5 公升	稀釋至 600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	
紅龍果	雜草	3-5 公升	稀釋至 600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥					不可噴及作物，以免發生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。						
百香果	雜草	3-5 公升	稀釋至 600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	
葡萄	雜草	3-5 公升	600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：芒稷、碎米莎草、昭和草、心葉母草、通泉草、龍葵、馬齒莧。	
楊桃	雜草	3-5 公升	稀釋至 600 公升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株					不可噴及作物，以免發生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。						
蓮霧	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	重複 範圍，本 項刪除。
蓮霧	雜草	3-5 公 升	600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
番石榴	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
龍眼	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				2. 雜草密集時 可使用高劑 量。						
荔枝	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
檬果	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
梨	雜草	3-5 公 升	600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
鼠李科 梨果類	雜草	3-5 公 升	600 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				可使用高劑量。						
柿	雜草	3-5 公 升	600 公 升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	
柑桔類	雜草	3-5 公 升	稀釋至 600 公 升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	
非耕作 農地	雜草	6.67 公 升	稀釋至 450 公 升	於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。					1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：雙穗雀稗、狗牙根、毛穎雀稗、鬼針草、昭和草。	
非耕作 農地	小花蔓 澤蘭	3-5 公 升	600 公 升	生育初期全面噴施					不可噴及作物，以免發	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用 量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									生藥害。	
<u>紅豆</u>	<u>植株乾 燥處理</u>	<u>3 公升</u>	<u>200</u>	<u>紅豆全株達 80% 以上淡褐色乾枯 之完熟期，於採 收前 7 天全株 均勻噴施 1 次。</u>				<u>7</u>	<u>施藥後 14 天再進行翻 耕及水稻插 秧工作。</u>	本 項 新增

18.020% 固殺草 溶液 (SL)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
甘藍	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
茄科小 葉菜類	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
蔥	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
馬鈴薯	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
金針	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。						
茄科果 菜類	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
甜椒	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					1. 不可噴 及作 物，以 免發 生藥 害。 2. 防除對 象：小 葉碎 米薺、 鵝兒 腸、 通泉 草、 牛筋 草、 馬齒 莧、 野 莧。	
胡瓜	雜草	2.25-3.75 公升	800公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
苦瓜	雜草	2.25-3.75	稀釋至	1. 定植後畦面					1. 不可噴	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公升	800 公升	雜草高 2-5 公分時，均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：馬唐、碎米莎草、滿天星、牛筋草、馬齒莧。	
絲瓜	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公升	1. 定植後畦面雜草高 2-5 公分時，均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：馬唐、碎米莎草、滿天星、牛筋草、馬齒莧。	
扁蒲	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公升	1. 定植後畦面雜草高 2-5 公分時，均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：馬唐、碎米莎草、滿	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
									天星、牛筋草、馬齒莧。	
瓜果類	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時，均 勻噴施於雜 草植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					1. 不可噴 及作物，以 免發生藥害。 2. 防除對 象：馬齒莧、 芒稷、牛筋 草、龍葵、野 莧。	
香蕉	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					1. 不可噴 及作物，以 免發生藥害。 2. 防除對 象：芒稷、紫 花霍香薊、昭 和草、碎米莎 草、野莧。	
木瓜	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				2. 雜草密集時 可使用高劑 量。						
鳳梨	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
番荔枝	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
酪梨	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
紅龍果	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
				可使用高劑量。						
百香果	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公 升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	
葡萄	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					1. 不可噴及作物，以免發生藥害。 2. 防除對象：芒稷、碎米莎草、昭和草、心葉母草、通泉草、龍葵、馬齒莧。	
楊桃	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800 公 升	1. 於雜草生長旺盛時至開花前，將藥液均勻噴施於雜草植株上。 2. 雜草密集時可使用高劑量。					不可噴及作物，以免發生藥害。	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
蓮霧	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
番石榴	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
龍眼	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
荔枝	雜草	2.25-3.75 公升	稀釋至 800公升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
檬果	雜草	2.25-3.75	稀釋至	1. 於雜草生長					不可噴及作	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
		公升	800 公 升	旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					物，以免發 生藥害。	
梨	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
鼠李科 梨果類	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
柿	雜草	2.25-3.75 公升	800 公 升	1. 於雜草生長 旺盛時至開 花前，將藥 液均勻噴施 於雜草植株 上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	
柑桔類	雜草	5-10 公升	稀釋至 600 公	於雜草生長旺盛 時至開花前，將					1. 不可噴 及作	

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
			升	藥液均勻噴施於 雜草植株上。					2. 物，以 免發生 藥害。 防除對 象：馬 唐、畫 眉草、 刺 殼 草、珠 仔草、 節 節 花、野 牽牛、 野 荳 、牛 筋 草、白 茅、紅 毛草。	
非耕作 農地	雜草	5 公升	稀釋至 600 公 升	於雜草生長旺盛 時至開花前，將 藥液均勻噴施於 雜草植株上。					1. 不可噴 及作物， 以免發生 藥害。 2. 防除對 象：雙 穗雀 稗、狗 牙根、 毛穎雀 稗、鬼 針草、 昭和 草。	
非耕作 農地	小花 蔓澤 蘭	2.25-3.75 公升	800 公 升	生育初期全面噴 施					不可噴及作 物，以免發 生藥害。	

5.66% 固殺草 溶液 (SL)

作物 名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全 採收 期(天)	注意事項	說明
甘藍	雜草	8 公升	600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時,均勻 噴施於雜草 植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物,以免發 生藥害。	
瓜果類	雜草	8 公升	600 公 升	1. 定植後畦面 雜草高 2-5 公分時,均勻 噴施於雜草 植株上。 2. 雜草密集時 可使用高劑 量。					不可噴及作 物,以免發 生藥害。	