


檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年3月11日  
發文字號：農授防字第1111488422B號



主旨：公告修正「達滅脫定」農藥使用方法及其範圍如附件。  
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

## 「達滅脫定」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 3 月 11 日農授防字第 1111488422B 號公告

525 G/L (52.5% W/V) 達滅脫定 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
結球萵苣	疫病	0.3-1 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	最多 3 次		3		
馬鈴薯	晚疫病	0.75 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		6		
茄科果菜類	疫病	0.5-1.5 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			6	採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
金針	疫病	0.8-2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
洛神葵	疫病	0.6-1.2 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7			6		
瓜菜類	露菌病	0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		3		
胡瓜	露菌病	0.75 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		6		
瓜果類	露菌病	0.8 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		3		
葡萄	露菌病	0.75 公升	1,600	病害發生初期開始施藥。	7	最多 3 次		15		
花木	露菌病	0.6-2.5 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	最多 3 次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
不結球萵苣與半結球萵苣	疫病	0.8-1.0 公升	1,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		7		本項新增。