


檔 號：  
保存年限：

## 行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年5月23日  
發文字號：農授防字第1111488890A號



主旨：公告「氟美派」農藥使用方法及其範圍如附件。  
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

# 「氟美派」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 23 日農授防字第 1111488890A 號公告

## 一、新農藥普通名稱一覽表

| 普通名稱 | 英文普通名稱          | IUPAC/有效成分  |
|------|-----------------|---|
| 氟美派  | triflumezopyrim | 3,4-dihydro-2,4-dioxo-1-(pyrimidin-5-ylmethyl)-3-( $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-m-tolyl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium-3-ide |

## 二、「氟美派」農藥使用方法與範圍一覽表

10% 氟美派 水懸劑(SC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數  | 使用時期                         | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項      | 說明                        |
|------|------|---------|-------|------------------------------|---------|------|------|----------|-----------|---------------------------|
| 水稻   | 稻蟲類  | 0.25 公升 | 2,400 | 田間褐飛蟲密度每叢平均達 5 隻以上時全株施藥 1 次。 |         |      |      | 21       | 避免於開花期使用。 | 原始登記廠商名稱：台灣科迪華農業科技股份有限公司。 |