


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年3月30日
發文字號：農授防字第1111488559B號



主旨：公告修正「祿芬隆」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「祿芬隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 3 月 30 日農授防字第 1111488559B 號公告修正

4.4 (%) (w/w) 祿芬隆 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			18		
十字花科小葉菜類	紋白蝶	0.67 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			18		
蔥科小葉菜類	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
蔥科小葉菜類	夜蛾類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
蔥	夜蛾類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
<u>洋蔥、</u> <u>落蕎、</u> <u>珠蔥、</u> <u>蒜</u>	夜蛾類	0.5-1.3 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		本項修正。
蔥科根菜類	夜蛾類	0.6-0.8 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
番茄	夜蛾類	0.6 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
花豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
樹豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
豌豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施	7			14	適用於鮮豆。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				藥。						
菜豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
菜豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥	7			14	適用於鮮豆。	
蠶豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
扁豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
翼豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
刀豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
豇豆	夜蛾類	0.3-1公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於鮮豆。	
草莓	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
花木	夜蛾類	0.4-1.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
大豆	夜蛾類	0.4-0.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	共1-2次		7	適用於毛豆。	本項新增。

50 G/L (5% W/V) 祿芬隆 乳劑(EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
十字花科包葉菜類	紋白蝶	0.67公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			18		
十字花科小葉菜類	紋白蝶	0.67公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			18		
蔥科小葉菜類	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
蔥科小葉菜類	夜蛾類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
蔥	夜蛾類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		
洋蔥、 落蔞、 珠蔥、 蒜	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		本項修正。
蔥科根菜類	夜蛾類	0.6-0.8公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			10		重複範圍，本項刪除。
番茄	夜蛾類	0.6公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	2		6		
草莓	夜蛾類	0.5-1.3公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
花木	夜蛾類	0.4-1.7公升	1,500	害蟲發生時開始施藥。	7	最多2次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
大豆	夜蛾類	0.4-0.7	1,500	害蟲發生時開始施	7	共1-2		7	適用於毛	本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公升		藥。		次				
花豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
樹豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
豌豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
菜豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
菜豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
蠶豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
扁豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
翼豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
刀豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。
豇豆	夜蛾類	0.3-1 公升	1,500	害蟲發生 時開始施 藥。	7			14	適用於鮮 豆。	本項新 增。