


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年5月3日
發文字號：農授防字第1111488749A號



主旨：公告修正「滅芬農」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「滅芬農」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 5 月 3 日農授防字第 1111488749A 號公告

42.37 (%) 滅芬農 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
冬瓜、南瓜、扁蒲、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜、絲瓜、越瓜	白粉病	0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		3	本藥劑使用範圍： 瓜菜類(胡瓜除外)	本項修正。
洋香瓜、香瓜、西瓜	白粉病	0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	3		6		本項修正。
葡萄	白粉病	0.3 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	10	3		21		
薔薇科梨果類	白粉病	0.1-0.6 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			14		
鼠李科梨果類	白粉病	0.2-0.3 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			14		
鼠李科梨果類	白粉病	0.2-0.3 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			14		重複範圍，本項刪除。
柿	白粉病	0.3-0.4 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7			14		
花木	白粉病	0.2-0.6 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
胡瓜	白粉病	0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		3		本項新增。
木鱉果	白粉病	0.25 公升	4,000	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次		3		本項新增。