

檔 號：
保存年限：

農業部 公告

發文日期：中華民國112年8月7日
發文字號：農授防字第1121489193C號



留用

主旨：公告修正「達滅克絕」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

說明：新增350g/L(35%w/v)達滅克絕水懸劑(SC)之使用範圍(此範圍為業者申請35%WP變更為較安全劑型)。

部長 陳吉仲

「達滅克絕」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 8 月 7 日農授防字第 1121489193C 號公告修正

一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
350g/L (35% w/v)達滅克絕 SC	興農股份有限公司	112 年 8 月 7 日	本藥劑係 35%WP 轉換為更安全劑型。

二、「達滅克絕」農藥使用方法與範圍一覽表

35%(w/w) 達滅克絕 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葫蘆科小葉菜類	露菌病	0.5-1.3 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥。	7				採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	本項修正。
瓜菜類	露菌病	0.5-1.3 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥。	7				採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	本項修正。
胡瓜	露菌病	0.8-1.0 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多施藥 3 次			採收前 6 天(設施栽培 12 天)停止施藥。	
瓜果類	露菌病	0.5-1.3 公斤	1,500	病害發生初期開始施藥。	7				採收前 12 天(設施栽培 18 天)停止施藥。	本項修正。

350g/L (35% w/v) 達滅克絕 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葫蘆科小葉菜類	露菌病	0.5-1.3公升	1,500	病害發生初期開始施藥。	7				採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。	本藥劑係35%WP轉換為更安全劑型。
瓜菜類	露菌病	0.5-1.3公升	1,500	病害發生初期開始施藥。	7				採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。	
胡瓜	露菌病	0.8-1.0公升	1,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多施藥3次			採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。	
瓜果類	露菌病	0.5-1.3公升	1,500	病害發生初期開始施藥。	7				採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。	