

豆科與葫蘆科作物蟲害可共用防治藥劑清單((病蟲害加*註記者為延伸使用)

藥劑名稱	稀釋倍數	防治對象	安全採收期(天)	作用機制	藥劑類別	藥劑代號	毒性
加保利 50%可濕性粉劑	1000	豆莢螟	7	接觸毒，胃毒作用	氨基甲酸鹽類	IRAC 1A	輕毒
	500-1000	葫蘆科黃守瓜					
加保利 85%可濕性粉劑	1700	豆莢螟					
	850-1700	黃守瓜					
佈飛松 43%乳劑	800	豆科豆菜類葉部 薊馬類*	10 禁止用於豆苗	接觸毒、胃毒	有機磷劑	IRAC 1B	中等毒
		豆科作物葉部薊 馬類*	紅豆除外，豆菜 限結莢前用 豆菜和乾豆10天 葉用豌豆4天 豆薯12天				
		西瓜南黃薊馬 瓜類葉部薊馬類*	10				
	1000	瓜類金花蟲類*					
畢芬寧 2.5%水懸劑	1000	豆科銀葉粉蝨	豆莢：3 禁止用於豆苗	接觸毒及胃毒	合成除蟲菊類	IRAC 3	輕毒
		豆科蚜蟲類*	豆莢：3 禁止用於豆苗				
		豆科作物花部薊 馬類*(大豆、紅豆)	豆菜3天 乾豆7天				

藥劑名稱	稀釋倍數	防治對象	安全採收期(天)	作用機制	藥劑類別	藥劑代號	毒性
		和豆薯之外，禁止用於葉用豌豆) 洋香瓜銀葉粉蝨	6				
畢芬寧 2.8%乳劑	1000	豆科銀葉粉蝨	豆莢：3	接觸毒及胃毒	合成除蟲菊類	IRAC 3	中等毒
		豆科蚜蟲類*	禁止用於豆苗				
		豆科作物花部薊馬類* (大豆、紅豆和豆薯之外，禁止用於葉用豌豆)	豆菜 3 天 乾豆 7 天				
		洋香瓜銀葉粉蝨	6				
	1500	西瓜二點葉蟎	15				
福化利 25%乳劑	3000	豆科豆菜類葉部薊馬類*	7	接觸毒、胃毒	合成除蟲菊類	IRAC 3	輕毒
		西瓜南黃薊馬					
賽洛寧 2.46%膠囊懸著液	1000	敏豆番茄斑潛蠅	6	接觸毒、胃毒	合成除蟲菊類	IRAC 3	中等毒
		豆科銀葉粉蝨	豆莢：3 豆苗：9				
		豆薯花部薊馬類*	9				
	2000	豆科作物葉部薊馬類*	9 (乾豆除外)				
		豆科豆菜類夜	豆莢：3				

藥劑名稱	稀釋倍數	防治對象	安全採收期(天)	作用機制	藥劑類別	藥劑代號	毒性
		蛾、毒蛾*	豆苗：9				
		豆科豆菜類葉部 薊馬類*	9				
		西瓜南黃薊馬	7				
		葫蘆科瓜果類夜 蛾類、植食性瓢 蟲類、金花蟲類*	7				
賽洛寧 2.5%微乳劑	1000	敏豆番茄斑潛蠅	6	接觸毒、胃毒	合成除蟲菊類	IRAC 3	中等毒
		豆科銀葉粉蝨	豆莢：3 豆苗：9				
		豆薯花部薊馬類*	9				
	2000	葫蘆科瓜果類夜 蛾類、植食性瓢 蟲類、金花蟲類*	7				
		豆科豆菜類夜蛾、 毒蛾*	豆莢：3 豆苗：9				
		豆科作物葉部薊 馬類*	9 (乾豆除外)				
		豆科葉部薊馬類*	9				
西瓜南黃薊馬	7						
賽洛寧 2.8%乳劑	1000	豆科銀葉粉蝨	豆莢：3	接觸毒、胃毒	合成除蟲菊類	IRAC 3	中等毒

藥劑名稱	稀釋倍數	防治對象	安全採收期(天)	作用機制	藥劑類別	藥劑代號	毒性
			豆苗：9				
		敏豆番茄斑潛蠅	6				
		豆薯花部薊馬類*	9				
	2000	西瓜南黃薊馬	7				
		豆科作物葉部薊馬類*	9 (乾豆除外)				
		豆科豆菜類夜蛾、毒蛾*	豆莢：3 豆苗：9				
		豆科葉部薊馬類*	9				
亞滅培 20%水溶性粉劑	4000	豆科作物葉部薊馬類*	乾豆除外 豆菜和豆薯6天 葉用豌豆9天	系統性	新尼古丁類	IRAC 4A	輕毒
		瓜類葉部薊馬類*	6				
		西瓜南黃薊馬	6				
		胡蘆科葉部薊馬類*	6				
益達胺 9.6%水懸劑	1500	冬瓜銀葉粉蝨	6	系統性、胃毒、神經毒	新尼古丁類	IRAC 4A	輕毒
		花胡瓜南黃薊馬	6				
		瓜類葉部薊馬類*	21				
		洋香瓜銀葉粉蝨	21				

藥劑名稱	稀釋倍數	防治對象	安全採收期(天)	作用機制	藥劑類別	藥劑代號	毒性
	2000	瓜類粉蝨類*	洋香瓜、香瓜、西瓜 21，其他瓜類 6 天				
		豆科作物葉部薊馬類*	乾豆除外 豆菜和葉用豌豆 9 天 豆薯 3 天				
		豆科葉部薊馬類*	9				
益達胺 9.6% 溶液	1500	冬瓜銀葉粉蝨	6	系統性、胃毒、神經毒	新尼古丁類	IRAC 4A	輕毒
		花胡瓜南黃薊馬					
		西瓜南黃薊馬					
		瓜類葉部薊馬類*	21				
	洋香瓜銀葉粉蝨	21					
	2000	豆科作物葉部薊馬類*	乾豆除外 豆菜和葉用豌豆 9 天 豆薯 3 天				
葉部薊馬類*		9					
達特南 20% 水溶性粒劑	3000	毛豆銀葉粉蝨	9	系統性、胃毒、神經毒、消化及接觸作用	新尼古丁類	IRAC 4A	輕毒
		豆科豆菜類粉蝨類*					

藥劑名稱	稀釋倍數	防治對象	安全採收期(天)	作用機制	藥劑類別	藥劑代號	毒性
		葉用豌豆、豆薯粉蝨類*	葉用豌豆 9 天 根部 3 天				毒性
		洋香瓜銀葉粉蝨	6				
		葫蘆科瓜類金花蟲類*					
		葫蘆科瓜類粉蝨類*					
因滅汀 5% 水溶性粒劑	4000	毛豆夜蛾	3	接觸毒、胃毒、神經毒	農用抗生素	IRAC 6	輕毒
		洋香瓜甜菜夜蛾	6				
阿巴汀 2% 乳劑	2000	豆菜類斑潛蠅類*	15	系統性	農用抗生素類	IRAC 6	中等毒
		洋香瓜番茄斑潛蠅	6				
	1000	洋香瓜銀葉粉蝨	12				
		豆薯潛蠅類	15				
克凡派 10% 水懸劑	1000	甜豆甜菜夜蛾	18	接觸毒、胃毒、選擇系統性	其他有機殺蟲劑	IRAC 13	中等毒
		豆菜類、葉用豌豆、豆薯夜蛾類、螟蛾類、毒蛾類*	豆菜類 18 天(毛豆除外) 葉用豌豆 10 天 採收根部者 3 天				
		洋香瓜南黃薊馬	6				
賽滅淨 75% 可濕性粉劑	6000	敏豆番茄斑潛蠅	7	接觸性	昆蟲生長調節劑	IRAC 17	輕毒

藥劑名稱	稀釋倍數	防治對象	安全採收期(天)	作用機制	藥劑類別	藥劑代號	毒性
		豆菜類斑潛蠅類*					
	5000	西瓜番茄斑潛蠅	6				
	7500	洋香瓜番茄斑潛蠅	15				
		瓜類斑潛蠅類*	15 胡瓜除外				