

# 輸歐盟印度棗病蟲草害防治用農藥參考基準

資料彙整：農業部農業藥物試驗所  
(115年4月30日)



一、雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與歐盟相等或較嚴之藥劑  
※請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

| 病蟲害別  | 藥劑名稱    | 歐盟 (ppm) | 台灣 (ppm) | 我國規定之安全採收期(天) | 備註 (作用機制)   |
|-------|---------|----------|----------|---------------|-------------|
| 白粉病   | 可濕性硫黃   | 免訂       | 免訂       |               | M2          |
| 炭疽病   | 貝萊斯芽孢桿菌 | 免訂       | 免訂       |               | BM02(BF)    |
|       | 枯草桿菌    | 免訂       | 免訂       |               | BM02(KHY8)  |
| 鱗翅目害蟲 | 鮎澤蘇力菌   | 免訂       | 免訂       |               | 11A(NB-200) |
| 雜草    | 固殺草     | 0.1      | 0.1      |               | 10 不可噴及作物   |

二、雙方皆訂有殘留容許量，但歐盟標準較我國略嚴之藥劑：  
※請謹慎使用，技術問題請洽轄區農業改良場

| 病蟲害別 | 藥劑名稱  | 歐盟 (ppm) | 台灣 (ppm) | 我國規定之安全採收期(天) | 備註 (作用機制) |
|------|-------|----------|----------|---------------|-----------|
| 白粉病  | ◎銅合硫磺 | 免訂       | 免訂       | 6             | 硫黃 M2     |
|      |       | 20       | 免訂       |               | 鹼性氯氧化銅 M1 |
| 疫病   | 三元硫酸銅 | 20       | 免訂       |               | M1        |

三、歐盟殘留容許量較我國嚴苛者：  
※應儘量避免使用

| 病蟲害別 | 藥劑名稱 | 歐盟 (ppm) | 台灣 (ppm) | 我國規定之安全採收期(天) | 備註 (作用機制) |
|------|------|----------|----------|---------------|-----------|
| 白粉病  | 邁克尼  | 0.01*    | 0.5      | 6             | 3         |
|      | 賽福座  | 0.01*    | 1        | 12            | 3         |
|      | 護汰芬  | 0.01*    | 0.4      | 6             | 3         |
|      | 菲克利  | 0.01*    | 0.5      | 6             | 3         |
|      | 平克座  | 0.01*    | 0.2      | 6             | 3         |
|      | 比芬諾  | 未訂       | 0.5      | 6             | 3         |
|      | 護矽得  | 0.01*    | 0.2      | 9             | 3         |
|      | 三泰隆  | 0.01*    | 1        | 15            | 3         |
|      | 三泰芬  | 0.01*    | 0.5(1)   | 10            | 3(三泰隆)    |

| 病蟲害別  | 藥劑名稱       | 歐盟<br>(ppm) | 台灣<br>(ppm) | 我國規定之<br>安全採收期(天) | 備註<br>(作用機制) |
|-------|------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 白粉病   | 氟克殺        | 0.01*       | 2           | 14                | 7            |
|       | 白克列        | 0.01*       | 2.5         | 21                | 7            |
|       | 派滅芬        | 未訂          | 0.2         | 14                | 7            |
|       | 布瑞莫        | 0.01*       | 2           | 2                 | 8            |
|       | 三氟敏        | 0.01*       | 0.5         | 18、21             | 11           |
|       | 保粒黴素(甲)    | 未訂          | 免訂          | 未訂                | 19           |
|       | 滅芬農        | 0.01*       | 1           | 14                | 50           |
|       | 克熱淨(烷苯磺酸鹽) | 未訂          | 0.2         | 6                 | M7           |
|       | ◎白列克敏      | 0.01*       | 2.5         | 12                | 白克列 7        |
|       |            | 0.02*       | 1           |                   | 百克敏 11       |
|       | ◎貝芬菲克利     | 0.1*        | 1.5         | 6                 | 貝芬替 1        |
|       |            | 0.01*       | 0.5         |                   | 菲克利 3        |
|       | ◎硫黃芬胺      | 免訂          | 免訂          | 7                 | 硫黃 M2        |
| 0.01* |            | 0.15        | 賽芬胺 U6      |                   |              |
| 炭疽病   | 克收欣        | 0.01*       | 1           | 6                 | 11           |
|       | 亞托敏        | 0.1         | 0.5         | 9                 | 11           |
|       | 百克敏        | 0.02*       | 1           | 15                | 11           |
|       | 扶吉胺        | 0.01*       | 0.5         | 9                 | 29           |
|       | 得克利        | 0.02*       | 1           | 21                | 3            |
|       | 滅特座        | 0.02*       | 0.5         | 28                | 3            |
|       | 免得爛        | 0.05*       | 2.5         | 21                | M3           |
|       | ◎三氟派瑞      | 0.01*       | 0.5         | 14                | 三氟敏 11       |
|       |            | 0.01*       | 0.5         |                   | 氟派瑞 7        |
|       | ◎賽普護汰寧     | 0.02*       | 1           | 18                | 賽普洛 9        |
| 0.01* |            | 5           |             | 護汰寧 12            |              |
| 疫病    | ◎銅滅達樂      | 20          | 免訂          | 14                | 鹼性氯氧化銅 M1    |
|       |            | 0.05*       | 0.2         |                   | 滅達樂 4        |
|       | ◎銅右滅達樂     | 20          | 免訂          | 14                | 鹼性氯氧化銅 M1    |
|       |            | 0.05*       | 0.2         |                   | 右滅達樂 4       |
| 銹病    | 三氟敏        | 0.01*       | 0.5         | 18                | 11           |
|       | 克熱淨        | 未訂          | 0.2         | 6                 | M7           |
|       | ◎氟殺克敏      | 0.02*       | 1           | 14                | 百克敏 11       |
|       |            | 0.01*       | 2           |                   | 氟克殺 7        |
| 輪斑病   | 免賴得        | 0.1*        | 1.5         | 6                 | 1(貝芬替)       |

| 病蟲害別       | 藥劑名稱  | 歐盟<br>(ppm) | 台灣<br>(ppm) | 我國規定之<br>安全採收期(天) | 備註<br>(作用機制) |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 夜蛾類<br>毒蛾類 | 納乃得   | 0.01*       | 0.5         | 6                 | 1A           |
|            | 加保利   | 0.01*       | 0.5         | 9                 | 1A           |
|            | 賽洛寧   | 0.01*       | 0.4         | 6                 | 3A           |
|            | 第滅寧   | 0.01*       | 0.2         | 6、9               | 3A           |
|            | 賜諾特   | 0.02*       | 0.2         | 6                 | 5            |
|            | 克凡派   | 0.01*       | 0.5         | 15                | 13           |
|            | 二福隆   | 0.01*       | 1           | 28                | 15           |
|            | 得芬諾   | 0.01*       | 0.5         | 21                | 18           |
| 粉介殼蟲類      | 礦物油   | 0.01*       | 免訂          |                   | NC 休眠期使用     |
|            | 布芬淨   | 0.01*       | 0.5         | 6                 | 16           |
|            | 賜派滅   | 0.02*       | 0.5         | 6                 | 23           |
|            | 達特南   | 未訂          | 0.5         | 9                 | 4A           |
|            | 速殺氟   | 0.01*       | 0.5         | 7                 | 4C           |
|            | 百利普芬  | 0.01*       | 0.5         | 9                 | 7C           |
| 蚜蟲類        | 賽洛寧   | 0.01*       | 0.4         | 6                 | 3A           |
|            | 畢芬寧   | 0.01*       | 0.5         | 10                | 3A           |
|            | 亞滅培   | 0.01*       | 1           | 6                 | 4A           |
|            | 益達胺   | 0.01*       | 0.5         | 9                 | 4A           |
|            | 氟尼胺   | 0.03*       | 0.2         | 6                 | 29           |
| 葉蟬類        | 亞滅寧   | 0.2         | 2           | 6                 | 3A           |
|            | 賽洛寧   | 0.01*       | 0.4         | 6                 | 3A           |
|            | 達特南   | 未訂          | 0.5         | 10                | 4A           |
| 蓟馬類        | 丁基加保扶 | 0.003*      | 0.5(0.1)    | 15                | 1A(加保扶)      |
|            | 第滅寧   | 0.01*       | 0.2         | 6                 | 3A           |
|            | 賽洛寧   | 0.01*       | 0.4         | 6                 | 3A           |
|            | 亞滅寧   | 0.2         | 2           | 6                 | 3A           |
|            | 亞滅培   | 0.01*       | 1           | 6                 | 4A           |
|            | 可尼丁   | 0.01*       | 1           | 9                 | 4A           |
|            | 達特南   | 未訂          | 0.5         | 9                 | 4A           |
|            | 益達胺   | 0.01*       | 0.5         | 9                 | 4A           |
|            | 賜諾特   | 0.02*       | 0.2         | 7                 | 5            |
|            | 克凡派   | 0.01*       | 0.5         | 15                | 13           |
|            | 賜派滅   | 0.02*       | 0.5         | 6                 | 23           |
| 葉蟎類        | 畢芬寧   | 0.01*       | 0.5         | 12                | 3A           |

| 病蟲害別 | 藥劑名稱 | 歐盟<br>(ppm) | 台灣<br>(ppm) | 我國規定之<br>安全採收期(天) | 備註<br>(作用機制) |
|------|------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| 葉蟎類  | 芬普寧  | 0.01*       | 0.5         | 21                | 3A           |
|      | 密滅汀  | 0.02*       | 0.2         | 6                 | 6            |
|      | 克凡派  | 0.01*       | 0.5         | 15                | 13           |
|      | 依殺蟎  | 0.01*       | 0.2         | 3                 | 10B          |
|      | 芬佈賜  | 0.01*       | 2           | 10                | 12B          |
|      | 亞醜蟎  | 0.01*       | 0.1         | 6                 | 20B          |
|      | 畢達本  | 0.01*       | 0.5         | 6                 | 21A          |
|      | 得芬瑞  | 0.01*       | 1           | 6                 | 21A          |
|      | 芬殺蟎  | 0.01*       | 0.5         | 9                 | 21A          |
|      | 賜滅芬  | 0.02*       | 2           | 7                 | 23           |
|      | 賜派芬  | 0.02*       | 0.5         | 15                | 23           |
|      | 賽芬蟎  | 0.01*       | 1           | 14                | 25A          |
|      | 扶吉胺  | 0.01*       | 0.5         | 9                 | 29           |

附註：

\*定量極限(LOD) 、◎混合劑、M3 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS<sub>2</sub> 計。

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以公告為準，相關資訊可參考下列網站：

1. 歐盟殘留標準請參考 [reurl.cc/Y33XRx](http://reurl.cc/Y33XRx) (0161050 Carambolas)
2. 我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 [goo.gl/RqtB4n](http://goo.gl/RqtB4n)
3. 我國登記使用農藥請參考農藥資訊服務網 [bit.ly/3YeY3m0](http://bit.ly/3YeY3m0) 或植物保護資訊系統 [bit.ly/3Q9GI1m](http://bit.ly/3Q9GI1m)

病蟲害防治技術諮詢請洽 [轄區改良場](#)

殘留標準可洽 [動植物防疫檢疫署](#) 或 [農業藥物試驗所](#)