

「滅芬百速隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 11014902990 號公告修正

31% 滅芬百速隆 其他(水溶性袋劑)(XXSB)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	3 公斤		插秧後 5~15 天 或稗草 1.5-2 葉 時施用。			1. 每公頃 均勻投 擲 200 個藥 包。 2. 保持積 水 3-7 日，水深 3-5 公 分。		1. 適用於水稻 移植本田雜 草。 2. 勿將水流入 其他田中。 3. 防除對象： 禾本科雜草 (稗草、芒稷 及千金 子)、莎草 科雜草(螢 蘭及球花蒿 草)及闊葉 雜草(尖瓣 花、水丁 香、水荳及 鱧腸)	本項新 增。 原始登 記廠商 名稱： 台灣日 產化工 股份有 限公司

滅芬百速隆 粒劑 (GR) 3.600%

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	25 公斤		插秧後5~10天或雜草1~2葉前，均勻撒佈於田面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 防除水稻移植本田雜草。 2. 施藥前排水，施藥後保持積水3~7天，水深3~5公分。 3. 防除對象：鴨舌草、稗草、水荳等。 	