

「美氟綜」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 1101490299M 號公告修正

22% 美氟綜 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
大豆	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			14	適用於乾豆	
十字花科包葉菜類	小菜蛾	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	3		18		
十字花科小葉菜類	小菜蛾	1.0-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	3		9		
大豆	夜蛾類	1.0-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7			15	適用於毛豆。	本項修正。
花木	夜蛾類	0.6-2.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7				限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
茶	捲葉蛾類	0.75 公升	1,500	害蟲發生時施藥。				21		
茄子 甜椒 番茄 辣椒	夜蛾類	0.5-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2-3 次		3		本項新增。原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司。