

輸澳洲毛豆病蟲草害防治用農藥參考基準

資料彙整：農業部農業藥物試驗所
(115 年 7 月)



一、雙方皆訂有容許量且我國標準與澳洲相等或較嚴之藥劑

※ 請遵守規定之安全採收期

病蟲害別	藥劑名稱	澳洲 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
苗立枯病	綠木黴菌	免訂	免訂		BM02(R42)
萎凋病	液化澱粉芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(PMB01.Tcba05)
葉枯病 葉斑病 褐斑病	液化澱粉芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(YCMA1)
葉燒病	貝萊斯芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(BF)
白粉病	枯草桿菌	免訂	免訂		BM02(Y1336)
	礦物油	免訂	免訂		NC
	碳酸氫鉀	免訂	免訂		NC
	可濕性硫黃	免訂	免訂		un
	白克列	3	1	9	7
灰黴病	液化澱粉芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(Ba-BPD1、 CL3、D747)
	貝萊斯芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(BF)
	白克列	3	1	9	7
炭疽病	貝萊斯芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(BF)
	亞托敏	3	0.5	14	11
	四氯異苯腈	7	5	6	M5
黑斑病	派滅芬	0.7	0.3	15	7
	氟克殺	1.5(0.5)	1.5	7	7(種子)
細菌性斑點病	貝萊斯芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(BACY)
	三元硫酸銅	免訂	免訂		M1
露菌病	液化澱粉芽孢桿菌	免訂	免訂		BM02(QST713)
	亞托敏	3	0.5	14	11
疫病	鹼性氯氧化銅	免訂	免訂		M1
	亞托敏	3	0.5	14	11
蚜蟲類	賽速安	T0.5	0.02	6	4A(可尼丁)

病蟲害別	藥劑名稱	澳洲 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
粉蝨類	賽速安	T0.5	0.02	6	4A(可尼丁)
	可尼丁	T0.1	0.1	6	4A
	賜派滅	2	1.5	7	23
潛蠅類	可尼丁	T0.1	0.1		4A
	賽滅淨	T1	1	7	17
薊馬類	賜派滅	2	1.5	7	23
鱗翅目害蟲 (夜蛾、毒蛾類 螟蛾類)	庫斯蘇力菌	免訂	免訂		11A (ABTS-351)
	鮎澤蘇力菌	免訂	免訂		11A (ABTS-1857、 NB-200、Ab12)
	納乃得	1	0.5	7	1A
	馬拉松	2	2	4	1B
	芬化利	0.5	0.1	14	3A
	阿巴汀	T0.1	0.08	7	6
	因滅汀	0.1	0.02	3	6
	剋安勃	2	0.5	6	28
	◎賽速安勃	T0.5	0.02	6	賽速安 4A(可尼丁)
		2	0.5		剋安勃 28
雜草	施得圃	T0.2	0.1		3

二、澳洲標準較我國略嚴之藥劑種類：

※ 請謹慎使用，技術問題請洽轄區農業改良場

病蟲害別	藥劑名稱	澳洲 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
炭疽病	◎三氟得克利	0.05	0.08	12	三氟敏 11
		0.5	0.5		得克利 3
銹病	鋅錳乃浦	2	2.5	12	M3
	三氟敏	0.05	0.08	7	11
蚜蟲類	第滅寧	0.1	0.2	7	3A
薊馬類	第滅寧	0.1	0.2	20	3A
鱗翅目害蟲	第滅寧	0.1	0.2	6	3A
雜草	嘉磷塞	*0.1	0.2		9
	剋草同	0.1	0.2		1
	固殺草	0.1	0.2		10

三、澳洲殘留容許量較我國嚴格者：

※ 請儘量避免使用

病蟲害別	藥劑名稱	澳洲 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
幼苗疫病	依得利	0.2	0.5		14
苗立枯病	賓克隆	未訂	0.05		20
白粉病	菲克利	未訂	0.3	9	3
	待克利	0.02	1	3	3
	三泰隆	0.05	2	3	3
	平克座	0.02	0.5	6	3
	四克利	0.02	2	2	3
	快諾芬	0.02	1	2	13
	◎氟殺克敏	1.5(0.5)	1.5	7	氟克殺 7(種子)
		0.05	0.5		百克敏 11
白絹病	撲滅寧	0.05	2	14	2
	福多寧	未訂	1	14	11
灰黴病	平硫瑞	0.05	3	3	7
	◎氟殺克敏	0.05	0.5	7	百克敏 11
		1.5(0.5)	1.5		氟克殺 7(種子)
炭疽病	待克利	0.02	1	3	3
	百克敏	0.05	0.5	7	11
	◎氟殺克敏	1.5(0.5)	1.5	7	氟克殺 7(種子)
		0.05	0.5		百克敏 11
	◎亞托待克利	3	0.5	7	亞托敏 11
		0.02	1		待克利 3
黑斑病	◎白列克敏	3	1	9	白克列 7
		0.05	0.5		百克敏 11
葉燒病	維利黴素	未訂	免訂		U18
銹病	嘉保信	未訂	5	6	7
	◎白列克敏	3	1	9	白克列 7
		0.05	0.5		百克敏 11
露菌病	滅達樂	0.1	2		4 拌種用
金花蟲類 植食性瓢蟲類	二福隆	未訂	1	21	15
青椿象	撲滅松	未訂	0.5	10	1B
葉蟬類	克福隆	未訂	未訂	15	15

病蟲害別	藥劑名稱	澳洲 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
粉蟲類	達特南	0.02	0.5	9	4A
	益達胺	0.05	3	9	4A
	速殺氟	0.01	4	7	4C
	百利普芬	0.1	0.2	9	7C
	派滅淨	0.02	0.5	21	9B
	賽安勃	0.05	1	3	28
蚜蟲類	福瑞松	未訂	0.05		1B 限種植前使用
	畢芬寧	0.03	1	3	3A
	氟尼胺	0.2	2	7	29
	苦參鹼	未訂	未訂		
潛蠅類	福瑞松	未訂	0.05		1B 限種植前使用
	佈飛松	0.02	1	7~15	1B
	賽洛寧	0.1	1	6~9	3A
	賽安勃	0.05	1	3	28
薊馬類	佈飛松	0.02	1	10	1B
	畢芬寧	0.03	1	3	3A
	貝他-賽扶寧	0.05	0.5	9	3A
	賽洛寧	0.1	1	3	3A
	福化利	0.02	0.5	7	3A
	益達胺	0.05	3	9	4A
	亞滅培	0.1	1	6	4A
	賜諾殺	0.01	0.3	3	5
	賜諾特	0.2	未訂	7	5
鱗翅目害蟲 (夜蛾、毒蛾類 螟蛾類)	硫敵克	0.1(1)	1(0.5)	14	1A(納乃得)
	佈飛松	0.02	1	10	1B
	賽滅寧	*0.01	0.5	9	3A
	賽洛寧	0.1	1	3	3A
	畢芬寧	0.03	1	3	3A
	賜諾特	0.2	未訂	7	5
	祿芬隆	0.02	1	7	15
	二福隆	未訂	1	21	15
	可芬諾	未訂	2	14	18
	因得克	0.05	0.5	6	22A
	美氟綜	0.2	1	15	22B

病蟲害別	藥劑名稱	澳洲 (ppm)	台灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期(天)	備註 (作用機制)
鱗翅目害蟲 (夜蛾、毒蛾類 螟蛾類)	苦參鹼	未訂	未訂		
	◎納得亞滅寧	1	0.5	6	納乃得 1A
		*0.01	0.5		亞滅寧 3A
	◎益滅賽寧	0.05	0.2	6	益滅松 1B
		*0.01	0.5		賽滅寧 3A
	◎佈飛百滅寧	0.02	1	10	佈飛松 1B
		0.05	1		百滅寧 3A
葉蟎類	密滅汀	未訂	0.2	7	6
	畢達本	未訂	0.1	14	21A
	芬普蟎	0.1	2	14	21A
雜草	快伏草	0.01	0.2		1
	西殺草	0.1	10		1
	左旋莫多草	0.02	0.1		15

附註：◎：混合劑。T：臨時限量。*：定量極限。

M3：二硫代氨基甲酸鹽類之容許量以 CS₂ 計，其適用於免得爛、鋅錳乃浦、錳乃浦、甲基鋅乃浦及得恩地等有機硫黃類殺菌劑之殘留總量。

☆登記藥劑與容許量不定時異動，仍應以公告為準，相關資訊可參考下列網站：

1. 澳洲之安全容許量基準值請參考 bit.ly/2pV5uTP
2. 我國農藥殘留容許量請參考衛福部食品藥物管理署網頁 goo.gl/RgtB4n
3. 我國登記使用農藥請參考農藥資訊服務網 bit.ly/3YeY3m0 或植物保護資訊系統 bit.ly/3Q9GI1m

病蟲害防治技術諮詢請洽 [轄區改良場](#)

殘留標準可洽 [動植物防疫檢疫署](#) 或 [農業藥物試驗所](#)