


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國112年3月13日
發文字號：農授防字第1121488356D號



主旨：公告修正「曼普胺」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「曼普胺」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 3 月 13 日農授防字第 1121488356D 號公告修正

250 g/L (25% w/v) 曼普胺 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蔥	疫病	0.3-0.5 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	最多 3 次		3		
甘藷	疫病	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15	適用於甘藷 塊根。	
豆薯	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
狗尾草	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
闊葉大豆	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
牛蒡	疫病	0.4-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
馬鈴薯	疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		15		
馬鈴薯	晚疫病	0.2-0.6 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	最多 3 次		15		
蒜	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7	適用於蒜 頭。	
洋蔥	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次		7		
落蕃	疫病	0.3-0.8 公升	2,500	病害發生 初期開始	7	連續 3 次		7	適用於落蕃 頭。	本項修 正。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥。						
珠蔥	疫病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		7	適用於紅蔥頭。	本項修正。
薑	疫病	0.4-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
芋	疫病	0.3-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次		15		
番茄	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
番茄	晚疫病	0.4-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
甜椒	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
辣椒	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
茄子	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
枸杞	疫病	0.2-0.6公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15	採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。	
洛神葵	疫病	0.2-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
秋葵	疫病	0.2-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			15		
胡瓜	露菌病	0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			6	採收前6天(設施栽培12天)停止施藥。	
西瓜	露菌病	0.3-0.8公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	最多3次		6		
草莓	疫病	0.4-0.5公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7			14		
花木	疫病	0.2-1公升	2,500	病害發生初期開始施藥。	7	連續3次			限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。	
<u>韭</u>	<u>疫病</u>	<u>0.3-0.5公升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生初期開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>最多3次</u>		<u>3</u>		本項新增。
<u>珠蔥</u>	<u>疫病</u>	<u>0.3-0.5公升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生初期開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>最多3次</u>		<u>3</u>	<u>適用於珠蔥葉。</u>	本項新增。
<u>落蕎</u>	<u>疫病</u>	<u>0.3-0.5公升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生初期開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>最多3次</u>		<u>3</u>	<u>適用於落蕎葉。</u>	本項新增。
<u>蒜</u>	<u>疫病</u>	<u>0.3-0.5公升</u>	<u>2,500</u>	<u>病害發生初期開始施藥。</u>	<u>7</u>	<u>最多3次</u>		<u>3</u>	<u>適用於蒜葉。</u>	本項新增。