


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年1月11日
發文字號：農授防字第1111488057A號



主旨：公告修正「施得圃」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778
號公告。

主任委員 傅吉仲

「施得圃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 1 月 11 日農授防字第 1111488057A 號公告修正

38.7% 施得圃 膠囊懸著劑 (CS)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	1.5 公升	加水至 600 公升	於水稻移植後 1-3 天施藥 1 次。					防除移植本田雜草。防除對象：稗草、畔茅、母草。	
落花生	雜草	4.5-5.4 公升	200-250	雜草萌芽前。			播種覆土後，雜草萌芽前全面噴於土面。			
紅豆	雜草	4.5-5.4 公升	200-250	播種覆土後，雜草萌芽前。			全面噴施於土壤表面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。 2. 防除對象：牛筋草、旱辣蓼、龍葵、野苳、小葉灰藿、滿天星。 	
大豆	雜草	2 公升	300				整地耙平後，將藥劑全面均勻噴於土壤表面，並與土壤混		限採收乾大豆者使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							合後開始播種。			
大豆	雜草	2.63-3.94公升	400	播種後。			整地播種後全面噴於土壤表面。		限採收乾大豆者使用。	
甘藍	雜草	1.67公升	600	定植前。			定植前一天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。		土壤表面濕潤後施藥。	
結球白菜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
結球白菜	雜草	1.67公升	1,200	定植前1天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野莧、馬齒 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									莧、珠仔草。	
結球萵苣	雜草	1.67公升	1,200	定植前1天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。					1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野莧、馬齒莧、珠仔草。	
結球萵苣	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
萵菜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									莧、馬唐草等一年生草。	
豆科小葉菜類	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
小白菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
油菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
青江菜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		草。 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芥藍	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芥菜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
不結球萵苣與半結球萵苣	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
茼蒿	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
蒜	雜草	3.15公升	200	雜草萌芽後。			栽植後畦田禾本科雜		施藥時田間應保持濕潤狀態。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							草萌芽至1-2葉時，將藥劑均勻全面噴施。			
韭	雜草	3公升	700	畦面雜草萌芽至1~2葉時將藥劑均勻全面噴施。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧。 	
芹菜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。 	
菠菜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴		1. 施藥後土壤應	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							施於畦面。		保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
莧菜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
甘藷	雜草	1.5公升	400	播植後第一天。			均勻噴施於畦面。		1. 防治對象：龍葵、小葉藜、馬齒莧、芒稷。 2. 適合秋作及塊根用品種。	
豆科根	雜草	2.5公升	稀釋至	播種覆土					施用時土壤	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類			600公升	後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					需維持濕潤。	
蘿蔔	雜草	1.25-1.67公升	600	播種後。			播種後均勻噴射於畦面。			
洋蔥	雜草	2公升	500	定植後。			定植後2-4天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝道。		土壤表面濕潤後施藥。	
金針	雜草	3.15公升	200	雜草萌發至1-2葉時均勻噴施。			-		施藥時田間應保持濕潤狀態。	
番茄	雜草	2公升	300	雜草萌芽後。			定植第一次培土後俟雜草1-2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。		避免噴及作物之生長點。	
甜椒	雜草	2.14公升	700	定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於					<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				土面。					草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
辣椒	雜草	2.14公升	700	定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
枸杞	雜草	2.14公升	700	定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
香瓜茄	雜草	2.14公升	700	定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
酸漿	雜草	2.14公升	700	定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
樹番茄	雜草	2.14公升	700	定植第一次培土後雜草1~2葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
胡瓜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
苦瓜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
絲瓜	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
扁蒲	雜草	1.25-1.67公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
豆科豆菜類	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
大豆	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後。			全面噴濕於土壤表面。		限毛豆園使用。施藥時田間應保持濕潤狀態。	
菜豆	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後，全面噴施於土壤表面。					1. 施藥時田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：通泉草、刺莧、龍葵、牛筋草、芒稷、野莧。	

34% 施得圃 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
落花生	雜草	5-6 公升	180-200	雜草萌芽前。			播種覆土後，雜草萌芽前全於土面噴。			
紅豆	雜草	5-6 公升	180-200	播種覆土後，雜草萌芽前。			全面噴施於土壤表面。		1. 播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。 2. 防除對象：牛筋草、旱辣蓼、龍葵、野萵、小葉灰藿、滿天星。	
大豆	雜草	2.5 公升	240				整地耙平後，將藥劑全均噴於土壤表面，並與土壤混合後開始播種。		限採收乾大豆者使用。	
大豆	雜草	3-4.5 公升	350	播種後。			整地播種後全於土壤表面噴。		限採收乾大豆者使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
甘藍	雜草	2 公升	500	定植前。			定植前一天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。		土壤表面濕潤後施藥。	
結球白菜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
結球白菜	雜草	2 公升	1,000	定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野莧、馬齒莧、珠仔草。 	
結球萵苣	雜草	2 公升	1,000	定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射					<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				於畦面。					象：小葉灰藿、牛筋草、野萵、馬齒莧、珠仔草。	
結球萵苣	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。 	
萵菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。 	
豆科小葉菜類	雜草	2.5-4.5公升	240-350	播種覆土後，雜草萌芽					施用時土壤需維持濕潤。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				前，全面均勻噴施於土壤表面。						
小白菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
油菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
青江菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芥藍	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芥菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
不結球萵苣與半結球萵苣	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
茼蒿	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰薹、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
蒜	雜草	3.5公升	180	雜草萌芽後。			栽植後畦田禾本科雜草萌發至1-2葉時，將藥劑均勻噴施。		施藥時田間應保持濕潤狀態	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蔥	雜草	2.0 公升	500	定植後2-4天畦面濕潤時，均勻噴施於畦面及畦溝兩側之畦脊。					施藥時田間應保持濕潤狀態。	
韭	雜草	3.5 公升	600	畦面雜草萌芽至1~2葉時將藥劑均勻全面噴施。					1. 施藥後田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧。	
芹菜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐等一年	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									草。	
芫荽	雜草	1.5-2.0 公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					施藥時田間應保持濕潤狀態。	
菠菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
莧菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
甘藷	雜草	2公升	300	播植後第一天。			均勻噴施於畦面。		1. 防治對象：龍葵、小藜、馬齒	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									莧、芒稷。 2. 適合秋作及塊根用品種。	
豆科根菜類	雜草	2.5-4.5 公升	240-350	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
蘿蔔	雜草	1.5-2 公升	500	播種後。			播種後均勻噴射於畦面。			
洋蔥	雜草	2.5 公升	400	定植後。			定植後2-4天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝兩道。		土壤表面濕潤後施藥。	
胡蘿蔔	雜草	1.5-2.0 公升	750-1,000	播種後至雜草萌芽前均勻噴施於畦面。					施藥後土壤應保持濕潤狀態。	
金針	雜草	3.5 公升	180	雜草萌芽至1-2葉時均勻噴施					施藥時田間應保持濕潤狀態。	
番茄	雜草	2.5 公升	240	雜草萌芽後。			定植第一次培土後俟		避免噴及作物之生長點。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							雜草 1-2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。			
甜椒	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
辣椒	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
枸杞	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				狀將藥劑均噴施於土面。					稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
香瓜茄	雜草	2.5 公升	600	定植第一次土後雜草1~2葉時，以定向狀將藥劑均噴施於土面。					1. 避免噴及作物生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
酸漿	雜草	2.5 公升	600	定植第一次土後雜草1~2葉時，以定向狀將藥劑均噴施於土面。					1. 避免噴及作物生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
樹番茄	雜草	2.5 公升	600	定植第一次土後雜草1~2葉時，以定向狀將藥					1. 避免噴及作物生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				劑均勻噴施於土面。					草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
胡瓜	雜草	1.5-2公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
苦瓜	雜草	1.5-2公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
絲瓜	雜草	1.5-2公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
扁蒲	雜草	1.5-2公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
豆科豆菜類	雜草	2.5-4.5公升	240-350	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
菜豆	雜草	3-4.5公升	1,000-1,500	整地播種後全面噴施於土壤表面。					1. 施藥時田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									象：牛筋草、大指草、小指草、旱辣蓼、山芥菜、野萵。	
高粱	雜草	1.5 公升	加水至600 公升	整地後，土壤表面濕潤時，藥液均勻噴施於土壤表面後7日播種。					高粱種子及幼苗對除草劑極為敏感，勿任意提高用藥量，以免發生藥害。	本項新增。

5% 施得圃 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	30 公斤		插秧後。					防除移植本田雜草。雜草萌後處理(對螢蔞發生多之稻田不適用)。	

75% 施得圃 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	1.33 公斤	750	定植後。			定植後將藥劑均勻噴射於畦面。		施藥前後土壤應保持濕潤狀態。	