

檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國112年7月4日
發文字號：農授防字第1121488973A號



主旨：公告修正「施得圃」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。
說明：新增之330g/L(33% w/v)施得圃乳劑係變更自34%(w/w)施得圃乳劑之濃度表示方式。

主任委員 傅吉仲

「施得圃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 7 月 4 日農授防字第 1121488973A 號公告修正

38.7(%) (w/w) 施得圃 膠囊懸著劑 (CS)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	1.5 公升	加水至 600 公升	於水稻移植後 1-3 天施藥 1 次。					防除移植本田雜草。防除對象：稗草、畔茅、母草。	
落花生	雜草	4.5-5.4 公升	200-250	雜草萌芽前。			播種覆土後，雜草萌芽前全面噴於土面。			
紅豆	雜草	4.5-5.4 公升	200-250	播種覆土後，雜草萌芽前。			全面噴施於土壤表面。		1. 播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。 2. 防除對象：牛筋草、旱辣蓼、龍葵、野苧、小葉灰藿、滿天星。	
大豆	雜草	2 公升	300				整地耙平後，將藥劑全面均勻噴於土		限採收乾大豆者使用。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							壤表面，並與土壤混合後開始播種。			
大豆	雜草	2.63-3.94 公升	400	播種後。			整地播種後全面噴於土壤表面。		限採收乾大豆者使用。	
甘藍	雜草	1.67 公升	600	定植前。			定植前一天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。		土壤表面濕潤後施藥。	
結球白菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
結球白菜	雜草	1.67 公升	1,200	定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對象：小葉灰藿、牛 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									筋草、野萵、馬齒萵、珠仔草。	
結球萵苣	雜草	1.67 公升	1,200	定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。					1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野萵、馬齒萵、珠仔草。	
結球萵苣	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒萵、野萵、馬唐草等一年生草。	
萵菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
豆科小葉菜類	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
小白菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
油菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
青江菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芥藍	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									馬唐草等一年生草。	
芥菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
不結球萵苣與半結球萵苣	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
茼蒿	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
蒜	雜草	3.15 公升	200	雜草萌芽後。			栽植後畦田禾本科雜草萌發至 1-2 葉時，將藥劑均勻全面噴施。		施藥時田間應保持濕潤狀態。	
韭	雜草	3 公升	700	畦面雜草萌芽至 1~2 葉時將藥劑均勻全面噴施。					1. 施藥後田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野莧、龍葵、馬齒莧。	
芹菜	雜草	1.25-	900-	播種後均					1. 施藥後	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		1.67 公升	1,200	勻噴施於畦面。					2. 土壤應保持濕潤狀態。 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
菠菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
莧菜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
甘藷	雜草	1.5 公升	400	播植後第一天。			均勻噴施於畦面。		1. 防治對象：龍葵、小藜、馬齒莧、芒稷。 2. 適合秋作及塊根用品種。	
豆科根菜類	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
蘿蔔	雜草	1.25-1.67 公升	600	播種後。			播種後均勻噴射於畦面。			
洋蔥	雜草	2 公升	500	定植後。			定植後 2-4 天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝兩道。		土壤表面濕潤後施藥。	
番茄	雜草	2 公升	300	雜草萌芽後。			定植第一次培土後俟雜草 1-2 葉時，以定向帶		避免噴及作物之生長點。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							狀將藥劑均勻噴施於土面。			
甜椒	雜草	2.14 公升	700	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 	
辣椒	雜草	2.14 公升	700	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。 	
枸杞	雜草	2.14 公升	700	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
香瓜茄	雜草	2.14 公升	700	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
酸漿	雜草	2.14 公升	700	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
樹番茄	雜草	2.14 公升	700	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				勻噴施於土面。					稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
金針	雜草	3.15 公升	200	雜草萌發至 1-2 葉時均勻噴施。					施藥時田間應保持濕潤狀態。	
胡瓜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
苦瓜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									野萵、馬唐草等一年生草。	
絲瓜	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。 	
扁蒲	雜草	1.25-1.67 公升	900-1,200	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野萵、馬唐草等一年生草。 	
豆科豆菜類	雜草	2.5 公升	稀釋至600 公升	播種覆土後，雜草萌芽前，					施用時土壤需維持濕潤。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				全面均勻噴施於土壤表面。						
大豆	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後。			全面噴濕於土壤表面。		限毛豆園使用。施藥時田間應保持濕潤狀態。	
菜豆	雜草	2.5 公升	稀釋至 600 公升	播種覆土後，全面噴施於土壤表面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥時田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：通泉草、刺莧、龍葵、牛筋草、芒稷、野莧。 	

34%(w/w) 施得圃 乳劑 (EC)

330g/L (33% w/v) 施得圃 乳劑 (EC) (新增此劑型含量表示方法)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	雜草	1.5 公升	加水至 600 公升	整地後，土壤表面濕潤時，藥液均勻噴施於土壤表面後 7 日播種。					高粱種子及幼苗對除草劑極為敏感，勿任意提高用藥量，以免發生藥害。	
落花生	雜草	5-6 公升	180-200	雜草萌芽			播種覆土			

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升		前。			後，雜草萌芽前全面噴於土面。			
紅豆	雜草	5-6 公升	180-200	播種覆土後，雜草萌芽前。			全面噴施於土壤表面。		<ol style="list-style-type: none"> 播種覆土後，雜草萌芽前，全面噴施於土壤表面。 防除對象：牛筋草、旱辣蓼、龍葵、野苧、小葉灰藿、滿天星。 	
大豆	雜草	2.5 公升	240				整地耙平後，將藥劑全面均勻噴於土壤表面，並與土壤混合後開始播種。		限採收乾大豆者使用。	
大豆	雜草	3-4.5 公升	350	播種後。			整地播種後全面噴於土壤表面。		限採收乾大豆者使用。	
甘藍	雜草	2 公升	500	定植前。			定植前一天，田面保持濕潤		土壤表面濕潤後施藥。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
							時，均勻噴射於畦面。			
結球白菜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
結球白菜	雜草	2 公升	1,000	定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對象：小葉灰藿、牛筋草、野莧、馬齒莧、珠仔草。 	
結球萵苣	雜草	2 公升	1,000	定植前 1 天，田面保持濕潤時，均勻噴射於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤表面濕潤後施藥。 2. 防除對象：小 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									葉灰藿、牛筋草、野萵、馬齒萵、珠仔草。	
結球萵苣	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒萵、野萵、馬唐草等一年生草。 	
萵菜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒萵、野萵、馬唐草等一年生草。 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
豆科小葉菜類	雜草	2.5-4.5公升	240-350	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
小白菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
油菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
青江菜	雜草	1.5-2公升	750-				播種後均		1. 施藥後	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升	1,000				勻噴施於畦面。		2. 土壤應保持濕潤狀態。 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芥藍	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芥菜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
不結球莴苣與半結球莴苣	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	
茼蒿	雜草	1.5-2 公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
蒜	雜草	3.5 公升	180	雜草萌芽後。			栽植後畦田禾本科雜草萌發至 1-2 葉時，將藥劑均勻全面噴施。		施藥時田間應保持濕潤狀態。	
蔥	雜草	2.0 公升	500	定植後 2-4 天畦面濕潤時，均勻噴施於畦面及畦溝兩側之畦脊。					施藥時田間應保持濕潤狀態。	
韭	雜草	3.5 公升	600	畦面雜草萌芽至 1~2 葉時將藥劑均勻全面噴施。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：鵝兒腸、小葉灰藿、牛筋草、節節花、滿天星、野萵、龍葵、馬齒莧。 	
芹菜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥後土壤應保持濕潤狀 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
芫荽	雜草	1.5-2.0公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					施藥時田間應保持濕潤狀態。	
菠菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
莧菜	雜草	1.5-2公升	750-1,000				播種後均勻噴施於畦面。		1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
甘藷	雜草	2 公升	300	播種後第一天。			均勻噴施於畦面。		1. 防治對象：龍葵、小藜、馬齒莧、芒稷。 2. 適合秋作及塊根用品種。	
豆科根菜類	雜草	2.5-4.5 公升	240-350	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
蘿蔔	雜草	1.5-2 公升	500	播種後。			播種後均勻噴射於畦面。			
洋蔥	雜草	2.5 公升	400	定植後。			定植後 2-4 天畦面濕潤時噴於畦面及畦溝兩道。		土壤表面濕潤後施藥。	
胡蘿蔔	雜草	1.5-2.0 公升	750-1,000	播種後至雜草萌發前均勻噴施於畦面。					施藥後土壤應保持濕潤狀態。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	雜草	2.5 公升	240	雜草萌芽後。			定植第一次培土後俟雜草 1-2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。		避免噴及作物之生長點。	
甜椒	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
辣椒	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
枸杞	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2					1. 避免噴及作物之生長	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
香瓜茄	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
酸漿	雜草	2.5 公升	600	定植第一次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					1. 避免噴及作物之生長點。 2. 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
樹番茄	雜草	2.5 公	600	定植第一					1. 避免噴	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		升		次培土後雜草 1~2 葉時，以定向帶狀將藥劑均勻噴施於土面。					2. 及作物之生長點。 防除對象：芒稷、牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、龍葵、野莧。	
金針	雜草	3.5 公升	180	雜草萌發至 1-2 葉時均勻噴施。					施藥時田間應保持濕潤狀態。	
胡瓜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
苦瓜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
絲瓜	雜草	1.5-2 公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草等一年生草。	
扁蒲	雜草	1.5-2 公升	750-1,000	播種後均勻噴施於畦面。					1. 施藥後土壤應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、小葉灰藿、馬齒莧、野莧、馬唐草	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
									等一年生草。	
豆科豆 菜類	雜草	2.5-4.5 公升	240-350	播種覆土後，雜草萌芽前，全面均勻噴施於土壤表面。					施用時土壤需維持濕潤。	
菜豆	雜草	3-4.5 公升	1,000-1,500	整地播種後全面噴施於土壤表面。					<ol style="list-style-type: none"> 1. 施藥時田間應保持濕潤狀態。 2. 防除對象：牛筋草、大指草、小指草、旱辣蓼、山芥菜、野苧。 	

5%(w/w) 施得圃 粒劑 (GR)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	雜草	30 公斤		插秧後。					防除移植本田雜草。雜草萌後處理(對螢蘭發生多之稻田不適用)。	

75%(w/w) 施得圃 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
洋蔥	雜草	1.33 公斤	750	定植後			定植後將藥劑均勻噴射於畦面。		施藥前後土壤應保持濕潤狀態。	