

一、 三氟得克利

27.300 %三氟得克利 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
檬果	炭疽病	0.33 公升	3000	檬果開花初期開始使用，7 天施用 1 次，連續 4 次，小果期後改為 14 天施藥 1 次，施藥至套袋停止施藥。				14		原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司

二、 三氟敏

500 G/L (50% W/V)三氟敏 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
柑桔類	黑點病	0.1-0.2 公升	10000	病害發生初期開始施藥	7	-	-	21	金桔、金柑採收前 27 天停止施藥。其他柑桔類採收前 21 天停止施藥。	延伸使用
柑桔類	黑點病		10000	自謝花後施藥	21	4	-	14		延伸使用

三、 白列克收欣

27.300 %白列克收欣 SC

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
草莓	白粉病	0.7-1.5 公升	1,200	病害發生初期開始施藥	7	最多 3 次		5		延伸使用

四、 液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1

5x10⁹ CFU/G 以上液化澱粉芽孢桿菌 YCMA1 WP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
柑桔類	潰瘍病	1.3 公斤	600	結果後開始施藥	7	連續 4 次			藥液需均勻噴施於	原始登記廠商名稱：百泰生物科

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
									植株全株。	技股份有限公司

五、 達特南

20.000 % 達特南 SG

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔	施藥次數	施藥方法	安全採收期	注意事項	說明
蘆筍	粉蝨類	0.3-0.4 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥	7	共 2 次		6		延伸使用