

「賽安勃」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 1101490299R 號公告修正

10.2% 賽安勃 濃懸乳劑 (SE)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶籽。	查未訂有農藥殘留容許量標準，本項刪除。
茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶籽。	
油茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21		
油茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21		
山茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
山茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。						
茶	毒蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	
茶	避債蛾類	0.5 公升	3,000	害蟲發生時施藥 1 次。				21	適用於茶葉。	

10.26% 賽安勃 水分散性油懸劑(OD)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	粉蝨類	0.625公升	800	平均每葉成蟲數達1隻以上1週後開始施藥。	7	連續2次	藥液量500公升/公頃，藥劑量0.625公升/公頃。	4	避免於開花期使用。	本項新增。原始登記廠名稱：台灣富美實有限公司。
瓜果類	粉蝨類	0.625公升	800	平均每葉成蟲數達1隻以上1週後開始施藥。	7	連續2次	藥液量500公升/公頃，藥劑量0.625公升/公頃。	4	避免於開花期使用。	本項新增。原始登記廠名稱：台灣富美實有限公司。