


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國110年10月15日
發文字號：農授防字第1101490299G號



主旨：公告修正「貝萊斯芽孢桿菌BF」農藥使用方法及其範圍如附件。

依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「貝萊斯芽孢桿菌 BF」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 1101490299G 號公告修正

1×10⁹ CFU/G 貝萊斯芽孢桿菌 BF 可濕性粉劑(WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
水稻	白葉枯病	1.67 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 3 次			全株均勻噴施。	
油菜	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次			適用於油菜籽。	
十字花科包葉菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
十字花科小葉菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
十字花科根菜類	黑腐病	1.66 公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續 4 次				
草莓	灰黴病	2 公斤	600	病害發生初期開始施藥,每隔 7 天施藥一次,連續三次;進一步施藥則視病害發展和藥劑的持效期而定。					藥液須均勻噴施於植株全株。	
蓮霧	炭疽病	5 公斤	600	開花盛期開始施藥。	7	連續 4 次				
檬果	細菌性黑斑病	2 公斤	600	葉部發病初期開始,每隔 7						

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				天施藥一次，連續3次。幼果形成後開始施藥，每隔7天施藥一次，連續4次。						
柿	灰黴病	1.66公斤	600	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次；進一步施藥則視病害發展和藥劑的持效期而定。					藥液須均勻噴施於植株全株。	
茶	赤葉枯病	1.67公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次				
結球萵苣、不結球萵苣與半結球萵苣	細菌性斑點病	1.3-1.7公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次				本項新增。
芫荽	細菌性葉枯病	0.4-0.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次				本項新增。
豆科乾豆類、豆菜類、豆科小葉菜類、豆科根菜類、黃耆	葉燒病	0.8-2.5公斤	600	病害發生初期開始施藥。	7	連續4次				本項新增。
茄科小葉	細菌性	0.8-2.5	600	病害發生	7	連續4				本項新

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
菜類、 茄科根菜類、 茄科果菜類	斑點病	公斤		初期開始 施藥。		次				增。
芥藍	灰黴病	1.0-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。
蕹菜	灰黴病	1.7-2.5 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。
蘆筍	灰黴病	1.7-2 公 斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。
芹菜	灰黴病	0.4-1.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。
蔥科小葉 菜類、 蔥科根菜 類	灰黴病	1.3-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。
百合	灰黴病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新增。
金針	灰黴病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次			適用於 金 針 花。	本項新 增。
金針	灰黴病	1.3-3.3 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次			適用於 碧 玉 筍。	本項新 增。
茄科小葉 菜類、 茄科根菜 類、 茄科果菜 類	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新 增。
洛神葵	灰黴病	1-2 公	600	病害發生	7	連續 3				本項新

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		斤		初期開始施藥。		次				增。
秋葵	灰黴病	1-1.7公 斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新 增。
豆科乾豆 類、豆菜 類、豆科小 葉菜類、豆 科根菜 類、黃耆	灰黴病	0.8-2.5 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新 增。
菊科包葉 菜類、 菊科小葉 菜類、 菊科根菜 類、 向日葵、 風茹、 山防風、 艾草、 菊	灰黴病	0.4-1.7 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新 增。
花木	灰黴病	1-2公 斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新 增。
水稻	細菌性 條斑 病	1.67 公斤	600	病害發生 初期開始 施藥。	7	連續 3 次				本項新 增。