


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國110年10月29日
發文字號：農授防字第1101490387D號



主旨：公告修正「氟芬隆」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「氟芬隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 29 日農授防字第 1101490387D 號公告修正

9. 6%氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	玉米螟	0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			7		
蔥	夜蛾類	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
薑	玉米螟	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			12		
瓜菜類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
瓜果類	二點葉蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7	2		6		
茉莉	葉蟬類	0.5- 1.25 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	2,000	害蟲發生時施藥 1 次。				15		
蔥	葉蟬類	0.5-0.75 公升	2,000	害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始				12		本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				施藥，共1次。						

100 G/L (10% W/V) 氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
高粱	玉米螟	0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			7		
蔥	夜蛾類	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			12		
薑	玉米螟	0.3-0.4 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			12		
瓜菜類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			6		
瓜果類	夜蛾類	0.3-0.7 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥	7			6		
瓜果類	葉蟬類	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥	7			6		
瓜果類	二點葉蟬	0.5-0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥	7	2		6		
茉莉	葉蟬類	0.5- 1.25 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥	7			6		
茶	捲葉蛾類	0.5 公升	2,000	害蟲發生時施藥 1 次				15		
蔥	葉蟬類	0.5-0.75	2,000	害蟬發生				12		本項新

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		<u>公升</u>		<u>初期(當葉蟬每葉達3-5隻)開始施藥，共1次。</u>						增。