六十四、芋頭斜紋夜蛾

學名：*Spodoptera litura* (Fabricius)
英名：Tobacco cutworm, cotton worm
生活習性：

本蟲為雜食性，年發生8-11代，雌蟲產卵於葉背，一百至數百粒成一卵塊，上覆雌蛾之暗黃色尾毛，幼蟲初孵化時群集啃食葉肉，二、三齡後分散為害，中老齡幼蟲晝伏夜出，晝間潛伏於殘葉、葉柄基部凹陷處、葉下或雜草、土粒間，傍晚再爬出為害。

危害特徵：

被害葉片葉肉被啃食，僅留上表皮，或整片被食盡，僅留葉柄及葉脈，甚至鑽食塊莖，造成狼藉食痕及蟲孔。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%賽洛寧乳劑(lambda-cyhalothrin)	0.4-0.6公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.具呼吸中等毒、中度眼刺激性、皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
2.8%賽洛寧水懸劑(lambda-cyhalothrin)	0.4-0.6公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.採收前21天停止施藥。 2.具呼吸中等毒、中度眼刺激性、皮膚過敏性。 3.對蜜蜂具毒性。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。