


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年6月29日
發文字號：農授防字第1111489173B號



主旨：公告修正「枯草桿菌KHY8」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「枯草桿菌 KHY8」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 6 月 29 日農授防字第 1111489173B 號公告修正

1x10⁹ CFU/ML 枯草桿菌 KHY8 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
檬果	炭疽病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共 10 次			全株噴濕為準。	
檬果	炭疽病		50	果實包裝前浸泡於藥液約 15 秒後取出於通風處陰乾。						
檬果	細菌性黑斑病		500	自檬果開花初期開始進行施用，至套袋為止。	7	共 10 次			全株噴濕為準。	
桃	穿孔病	2-4 公升	500	自開花初期開始施用，每 7-10 天使用 1 次，至套袋或果實採收為止。						本項新增。
李	穿孔病	2-4 公升	500	自開花初期開始施用，每 7-10 天使用 1 次，至套袋或果實採收為止。						本項新增。
柑桔類	潰瘍病	1.6- 4.8 公升	500	自開花初期開始施用，每 7-10 天使用 1 次，至套袋或果實採收為止。						本項新增。
葡萄	晚腐病	1.6- 3.2 公升	500	自開花初期開始施用，每 7-10 天使用 1 次，至套袋或果實採收為止。						本項新增。
果樹	炭疽病	0.54-6 公升	500	自開花初期開始施用，每 7-10 天						本項新增。

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期 (天)	注意事 項	說明
				使用 1 次，至套袋或果實採收為止。						

1x10⁹ CFU/G 枯草桿菌 KHY8 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔 (天)	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期(天)	注意事 項	說明
水稻	稻熱病	3 公斤	400	於稻作插秧後 15 天、30 天、40 天、孕穗期及齊穗期，各施用 1 次。		共 5 次				