

「波爾多」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 1101490299H 號公告修正

72% 波爾多 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	露菌病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	3		<u>3</u>		本項修正。
瓜果類	露菌病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	3		<u>3</u>		本項修正。
洋香瓜	露菌病	2.5 公斤	400	病害發生初期開始施藥。	7	3		<u>3</u>		本項恢復為原登記作物品項。
楊桃	細菌性斑點病			病害發生初期開始施藥。	7	4		<u>6</u>	1. 定期清除罹病枝葉及果實。 2. 雨季來臨前，宜進行預防性施藥。(4-4 式波爾多液)	本項修正。
柑桔類	潰瘍病		500	病害發生初期開始施藥。	21	4-6		<u>6</u>		本項修正。
觀賞植物	苗檢疫處理			檢疫處理時施藥 1 次。					施藥量及稀釋倍數依輸入國之規定處理。	

36% 波爾多 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜菜類	露菌病	5 公升	200	病害發生初期開始施藥。	7	共 <u>3</u> 次				本項新增。原始登記廠商名稱：高事達農化有限公司。