


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年7月21日
發文字號：農授防字第1111489304A號



主旨：公告修正「得芬瑞」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「得芬瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 7 月 21 日農授防字第 1111489304A 號公告修正

10 (%) 得芬瑞 可溼性粉劑 (WP)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
香蕉	葉蟬類	0.1-0.5 公斤	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
木瓜	神澤氏葉蟬	1.0-1.5 公斤	2,000	害蟬發生時施藥 1 次。				6		
番荔枝	葉蟬類	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
酪梨	葉蟬類	0.5-1.0 公斤	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
草莓	二點葉蟬	0.3-0.4 公斤	3,000	害蟬發生時開始施藥。	7	2	噴藥時應全株均勻噴佈。	7	建議清晨或傍晚施藥。	
楊桃	葉蟬類	0.4-0.8 公斤	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			7		
蓮霧	葉蟬類	0.5-1.5 公斤	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			7		
番石榴	葉蟬類	0.6-1 公斤	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			7		
龍眼	葉蟬類	0.3-0.6 公斤	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			6		
荔枝	葉蟬類	0.3-0.6 公斤	2,000	害蟬發生	7			6		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公斤		時開始施藥。						
椪果	葉蟎類	0.5-1.0公斤	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			6		
印度棗	柑桔葉蟎	0.3-0.4公斤	3,000	害蟎發生時施藥1次。				6		本項修正。
柑桔類	柑桔葉蟎	0.67公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥。				9		
花木	葉蟎類	0.6-2.5公斤	1,000	害蟎發生時開始施藥。	7	最多2次			1. 限觀賞花卉使用，使用前宜先進行小面積藥害測試。 2. 可能引起薔薇嫩葉發生藥害。	本項修正。
菊	葉蟎類	0.35公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥。	7			18		
茉莉	葉蟎類	0.33-0.83公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥。	7			6		本項修正。
茶	葉蟎類	0.35公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥。				18		
番茄	葉蟎類	0.17-0.5公斤	3,000	害蟎發生初期開始施藥。	7	最多2次		3		本項新增。
甜椒	葉蟎類	0.17-0.5公斤	3,000	害蟎發生初期開始施藥。	7	最多2次		3		本項新增。
茄子	葉蟎類	0.17-0.5公斤	3,000	害蟎發生初期開始施藥。	7	最多2次		3		本項新增。
辣椒	葉蟎類	0.17-0.5	3,000	害蟎發生	7	最多		3		本項新

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		公斤		初期開始施藥。		2次				增。
枸杞	葉蟎類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟎發生 初期開始 施藥。	7	最多 2次		3		本項新增。
香瓜茄	葉蟎類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟎發生 初期開始 施藥。	7	最多 2次		3		本項新增。
樹番茄	葉蟎類	0.17-0.5 公斤	3,000	害蟎發生 初期開始 施藥。	7	最多 2次		3		本項新增。