


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年4月22日
發文字號：農授防字第1111488695A號



主旨：公告修正「賜滅芬」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「賜滅芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 4 月 22 日農授防字第 1111488695A 號公告修正

240 G/L (24% W/V) 賜滅芬 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
仙草	葉蟎類	0.35-0.75 公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				21		
茄科果菜類	葉蟎類	0.3-0.4 公升	2,000	害蟎發生初期施藥 1 次。				4		
香蕉	葉蟎類	0.14-0.45 公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				7		
木瓜	葉蟎類	0.25-1.0 公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				7	施用時須注意避免幼嫩葉片接觸過量藥劑。	
番荔枝	葉蟎類	0.35-0.75 公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				7		
酪梨	葉蟎類	0.5-1.0 公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				7		
百香果	葉蟎類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				7		
草莓	葉蟎類	0.6-1.0 公升	2,000	害蟎發生時施藥 1 次。				7		
葡萄	葉蟎類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			14		
楊桃	葉蟎類	0.4-0.8 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			14		
蓮霧	葉蟎類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			14		
番石榴	葉蟎類	0.6-1 公升	2,000	害蟎發生時開始施藥。	7			14		
龍眼	葉蟎類	0.38-	2,000	害蟎發生時				7		

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
		0.75 公升		施藥 1 次。						
荔枝	葉蟬類	0.3-0.6 公升	2,000	害蟬發生時施藥 1 次。				7		
檬果	葉蟬類	0.45-1.0 公升	2,000	害蟬發生時施藥 1 次。				7		
薔薇科梨果類	葉蟬類	0.5 公升	2,000	害蟬發生初期施藥 1 次。	14			7		
印度棗	葉蟬類	0.4 - 0.6 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			7		
柑桔類	葉蟬類	0.5-1.2 公升	2,000	害蟬發生時施藥 1 次。				14		
菊	葉蟬類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟬發生時施藥 1 次。				21		
茶	葉蟬類	0.5-1.5 公升	2,000	害蟬發生時開始施藥。	7			21	適用於茶葉。	
風茹	葉蟬類	0.45-0.6 公升	2,000	害蟬發生時施藥 1 次。				21		
當歸	葉蟬類	0.6-1.0 公升	2,000	害蟬發生時施藥 1 次。				21		
瓜菜類	葉蟬類	0.4-1 公升	2,000	害蟬發生初期施藥 1 次。				3		本項新增
瓜果類	葉蟬類	0.4-1 公升	2,000	害蟬發生初期施藥 1 次。				3		本項新增