


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國111年9月6日
發文字號：農授防字第1111489531B號



主旨：公告修正「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「氟派瑞」農藥使用方法及其範圍

中華民國 111 年 9 月 6 日農授防字第 1111489531B 號公告修正

500 G/L (50% W/V) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線蟲	0.2 公升	4,000	於植株定植後第 3 天澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或每公頃澆灌 800 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-					施用前請保持土壤濕潤。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				1,000 公升藥液。						
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.3 公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥					<ol style="list-style-type: none"> 施用前請保持土壤濕潤。 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時， 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				液。					會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.3公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌50-1,000公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
草莓	根瘤線蟲	0.46-0.72公升	4,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，施用前保持土壤濕潤。						
香蕉	根瘤線蟲	0.45公升	10,000	限苗期使用，使用前須維持根圍土壤濕潤，每株澆灌2-3公升藥液。						本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。

400 G/L (40% W/V) 氟派瑞 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄	根瘤線蟲	0.266公升	3,000	於植株定植後第3天澆灌稀釋藥液1次，每株澆灌40毫升，或每公頃澆灌800公升藥液。					施用前保持土壤濕潤。	
甜椒	根瘤線蟲	0.1-0.4公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌250-1,000公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
辣椒	根瘤線蟲	0.1-0.4公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌250-1,000公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
茄子	根瘤線蟲	0.1-0.4公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌250-1,000公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
枸杞	根瘤線蟲	0.1-0.4公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液					施用前請保持土壤濕潤。	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
				1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。						
香瓜茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
樹番茄	根瘤線蟲	0.1-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 250-1,000 公升藥液。					施用前請保持土壤濕潤。	
瓜菜類	根瘤線蟲	0.01-0.4 公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液 1 次，每株澆灌 40 毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌 50-1,000 公升藥液。					<ol style="list-style-type: none"> 施用前請保持土壤濕潤。 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。 	

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
瓜果類	根瘤線蟲	0.01-0.4公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，或依植株栽培密度，每公頃澆灌50-1,000公升藥液。					1. 施用前請保持土壤濕潤。 2. 胡瓜、美濃瓜嫩葉接觸到較高劑量氟派瑞時，會引起葉緣發生黃白化藥斑之現象。	
草莓	根瘤線蟲	0.62-0.96公升	3,000	於植株定植後澆灌藥液1次，每株澆灌40毫升，施用前保持土壤濕潤。						
香蕉	根瘤線蟲	0.6公升	7,500	限苗期使用，使用前須維持根圍土壤濕潤，每株澆灌2-3公升藥液。						本項新增。原始登記廠商名稱：台灣拜耳股份有限公司。