

「賽派芬」農藥使用方法及其範圍

中華民國 110 年 10 月 15 日農授防字第 1101490299Q 號公告修正

30% 賽派芬 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
木瓜	葉蟎類	0.8 公升	2,500	於葉蟎發生達每葉 10 隻時施藥 1 次。				3		
茶	葉蟎類	0.4 公升	5,000	葉蟎每葉發生達 3-5 隻時開始施藥。	7	最多 2 次		14	適用於茶葉。	
香蕉	葉蟎類	<u>0.11-0.36</u> 公升	<u>2,500</u>	害蟎發生初期開始施藥 1 次。				<u>7</u>		本項新增。
百香果	葉蟎類	<u>0.32-0.64</u> 公升	<u>2,500</u>	害蟎發生初期開始施藥 1 次。				<u>7</u>		本項新增。
番荔枝	葉蟎類	<u>0.25-0.6</u> 公升	<u>2,500</u>	害蟎發生初期開始施藥 1 次。				<u>7</u>		本項新增。
檬果	葉蟎類	<u>0.36-0.8</u> 公升	<u>2,500</u>	害蟎發生初期開始施藥 1 次。				<u>7</u>		本項新增。