


檔 號：
保存年限：

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國112年3月13日
發文字號：農授防字第1121488356C號



主旨：公告修正「氟芬隆」農藥使用方法及其範圍如附件。
依據：農藥管理法第13條暨本會92年12月18日農糧字第0920021778號公告。

主任委員 傅吉仲

「氟芬隆」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 3 月 13 日農授防字第 1121488356C 號公告修正

9.6(%) (w/w) 氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|--------------|-------|---------------------------------|---------|------|------|----------|--------|-------|
| 高粱 | 玉米螟 | 0.3 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 7 | | |
| 蔥 | 夜蛾類 | 0.3-0.5 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 12 | | |
| 蔥 | 葉蟬類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | | |
| 薑 | 玉米螟 | 0.3-0.4 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 12 | | |
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 0.3-0.7 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 0.3-0.7 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 瓜果類 | 葉蟬類 | 0.5-0.6 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 瓜果類 | 二點葉蟬 | 0.5-0.6 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | 2 | | 6 | | |
| 茉莉 | 葉蟬類 | 0.5- 1.25 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 茶 | 捲葉蛾類 | 0.5 公升 | 2,000 | 害蟲發生時施藥 1 次。 | | | | 15 | | |
| 蒜 | 葉蟬類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | 適用於蒜葉。 | 本項新增。 |
| 蒜 | 葉蟬類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥， | | | | 12 | 適用於蒜頭。 | 本項新增。 |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|----------------|-------|---------------------------------|---------|------|------|----------|---------|-------|
| | | | | 共 1 次。 | | | | | | |
| 珠蔥 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | 適用於珠蔥葉。 | 本項新增。 |
| 珠蔥 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | 適用於紅蔥頭。 | 本項新增。 |
| 落蕃 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | 適用於落蕃葉。 | 本項新增。 |
| 落蕃 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | 適用於落蕃頭。 | 本項新增。 |
| 韭菜 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | | 本項新增。 |
| 洋蔥 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | | 本項新增。 |

100 g/L (10% w/v) 氟芬隆 水分散性乳劑 (DC)

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|--------------|-------|---------------------------------|---------|------|------|----------|---------|-------|
| 高粱 | 玉米螟 | 0.3 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 7 | | |
| 蔥 | 夜蛾類 | 0.3-0.5 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 12 | | |
| 蔥 | 葉蟬類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | | |
| 薑 | 玉米螟 | 0.3-0.4 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 12 | | |
| 瓜菜類 | 夜蛾類 | 0.3-0.7 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 瓜果類 | 夜蛾類 | 0.3-0.7 公升 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 瓜果類 | 葉蟬類 | 0.5-0.6 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 瓜果類 | 二點葉蟬 | 0.5-0.6 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | 2 | | 6 | | |
| 茉莉 | 葉蟬類 | 0.5- 1.25 公升 | 2,000 | 害蟬發生時開始施藥。 | 7 | | | 6 | | |
| 茶 | 捲葉蛾類 | 0.5 公升 | 2,000 | 害蟲發生時施藥 1 次。 | | | | 15 | | |
| 蒜 | 葉蟬類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | 適用於蒜葉。 | 本項新增。 |
| 蒜 | 葉蟬類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻)開始施藥，共 1 次。 | | | | 12 | 適用於蒜頭。 | 本項新增。 |
| 珠蔥 | 葉蟬類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟬發生初期(當葉蟬每葉達 3-5 隻) | | | | 12 | 適用於珠蔥葉。 | 本項新增。 |

| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔(天) | 施藥次數 | 施藥方法 | 安全採收期(天) | 注意事項 | 說明 |
|------|------|----------------|-------|---|---------|------|------|----------|---------|-------|
| | | | | 開始施藥， 共 1 次。 | | | | | | |
| 珠蔥 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。 | | | | 12 | 適用於紅蔥頭。 | 本項新增。 |
| 落蕃 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。 | | | | 12 | 適用於落蕃葉。 | 本項新增。 |
| 落蕃 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。 | | | | 12 | 適用於落蕃頭。 | 本項新增。 |
| 韭菜 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。 | | | | 12 | | 本項新增。 |
| 洋蔥 | 葉蟎類 | 0.5-0.75 公升 | 2,000 | 害蟎發生初期(當葉蟎每葉達 3-5 隻) 開始施藥， 共 1 次。 | | | | 12 | | 本項新增。 |