

您的安全用藥好幫手

植物保護資訊系統

簡介



use your mobile
行動使用



smart search
智慧搜尋



phone or pc
雙向切換



all in one
多工合一



立即試用

手機版 植物保護資訊系統

藥毒所首頁 植物保護資訊系統 回系統首頁

主搜尋欄



各項功能

打電話給植物保護諮詢專線


植物保護諮詢服務專線



各項功能簡介

功能	用法
主搜尋欄	輸入關鍵字搜尋使用方法
作物目錄	植物保護手冊目錄
進階搜尋	限定關鍵字欄位進行查詢
藥劑檢索	查詢藥劑資料及核准使用範圍
作物查詢	查詢單一作物的用藥清單
引導模式	第一次使用的新手專用功能
藥劑編輯	將選定的藥劑放進來列印
作物分群	查詢該作物所屬的分類科別
生藥篩選	只搜尋生物農藥的功能
免登資材	查看免登記植物保護資材清單
共同防治	查不同作物可同時使用的藥劑
使用說明	本系統使用說明
意見回饋	有任何問題及意見歡迎提供
問卷調查	不定期推出問卷

植物保護資訊系統網址：
<https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm>



主搜尋欄 怎麼用?

01

請在這裡輸入關鍵字...

02

按下搜尋



可利用搜尋結果上方的**病害/蟲害/其他**按鈕
切換防治對象的頁面，並選擇防治對象進入
防治方法與藥劑清單畫面

關鍵字怎麼下?

可使用作物名稱、病蟲害名稱、藥劑名稱作為關鍵字，不同關鍵字中間應用空格隔開。

舉例：

作物 + 害物 = 防治對象
番茄 + 夜蛾 = 番茄夜蛾類

作物 + 藥劑 = 防治對象
蔬菜 + 培丹 = 蔬菜蚜蟲類

按 ▼ 可以做資料升降幕排序

01

進入防治對象頁面
可以查看核准用藥清單

按展開 ▼ 可查詢藥劑如何使用

2.8% 第滅寧 水基乳劑 (deltamethrin)	IRAC 3A	收圖 ▲
每公頃施藥量	0.7公升	
稀釋倍數(倍)	2,000	
施藥方法	於蝗蝻發生初期施藥，每隔7天施藥一次，連續一至二次。	
注意事項	採收前6天停止施藥。	

02

按**藥劑名稱**可以
切換到藥劑資料
與核准使用作物
清單

第滅寧(殺蟲劑) deltamethrin
基本資料 ▼
商品名稱 ▼
0.055%粉劑
0.5%囊袋
2.4%水懸劑
9.8%乳劑

03

按**防治對象名稱**
可以再切換回去

第滅寧(殺蟲劑) deltamethrin	2.4%水懸劑
防治對象	安全採收(幾天)
人心果果實蠅類	12
山茶科作物蚜蟲類 目害蟲	21
山藤果實蟻類	6
丹麥野島蟻類	6

電腦版 植物保護資訊系統

回系統首頁

植物保護資訊系統
Plant Protection Information System

主搜尋欄

各項功能



藥毒所首頁

掃描QR code進手機版

作物目錄 開闢式設計

01

全部展開作物列表

02

【高麗菜、高麗菜、白菜、椰菜】 所含作物清單

點選進入防治方法頁面

03

點選展開害物資料

04

用滑鼠看作用機制



每個功能右上角都有問號按鈕
按下它就可以知道這個功能要怎麼操作囉!

藥劑編輯

使用方法編輯模式

01

勾選想看到的藥劑使用方法

圖取	藥劑名稱	作用機制代碼
<input checked="" type="checkbox"/>	50% 免賴得 可濕性粉劑 (benomyl)	FRAC 1

02

放入編輯區

點選放入編輯區

03

把想看的都勾選放入編輯區

<input checked="" type="checkbox"/>	50% 免賴得 可濕性粉劑 (benomyl)	<input checked="" type="checkbox"/>	5% 菲克利 水懸劑 (hexaconazole)	<input checked="" type="checkbox"/>	52% 可濕性硫黃 水懸劑 (sulfur)
-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

04

點選進入藥劑編輯模式

進入藥劑編輯模式

藥劑名稱	作用機制代碼	每公頃劑量(公升)	噴霧次數(次)	噴霧方法	注意事項
50% 免賴得 可濕性粉劑 (Benomyl)	FRAC 1	0.50-1	3-1000	忌用噴水機噴霧。忌用噴霧機噴霧。忌用噴霧機噴霧。	1. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。 2. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。
5% 菲克利 水懸劑 (hexaconazole)	FRAC 3	0.02-0.4	2-1000	噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。忌用噴霧機噴霧。忌用噴霧機噴霧。	1. 本藥劑為非內吸性藥劑。噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。 2. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。
52% 可濕性硫黃 水懸劑 (sulfur)	IRAC 11	0.4-25	300	噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。忌用噴霧機噴霧。忌用噴霧機噴霧。	1. 本藥劑為非內吸性藥劑。噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。 2. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。

05

調整順序後列印(下載word檔) 想看哪條就印哪條

進階搜尋

精準搜尋結果

作物	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
害物	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑中文名稱	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑英文名稱	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑代碼	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑圖取	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑作用機制	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑圖取	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑圖取	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)
藥劑圖取	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> (完全相符)

還可勾選“完全符合”來排除不一樣的字串

生藥篩選

找出可用的生物農藥

作物	甘藍	<input type="checkbox"/> (完全相符)
害物	菜心螟	<input type="checkbox"/> (完全相符)

十字花科蔬菜菜蛾級類

藥劑名稱	作用機制代碼	每公頃劑量(公升)	噴霧次數(次)	噴霧方法	注意事項
60% 益隆 動力型-11 可濕性粉劑 (Bacillus thuringiensis bio-kurstaki strain B-912)	IRAC 11	1.0-1.7	1-1000	噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。忌用噴霧機噴霧。忌用噴霧機噴霧。	1. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。 2. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。
45% 益隆 可濕性粉劑 (Bacillus thuringiensis bio-kurstaki strain B-912)	IRAC 11	1.0-1.7	1-1000	噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。忌用噴霧機噴霧。忌用噴霧機噴霧。	1. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。 2. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。

只顯示生物農藥的使用方法，不必在一堆化學藥劑中大海撈針了

作物分群

查詢作物分群資料

作物	番茄
階層1	茄科果菜類
階層2	茄科作物

藥劑檢索

查詢藥劑資料

藥劑中文名稱	特瑪利
藥劑英文名稱	
藥劑代碼	
藥劑圖取	
藥劑作用機制	
藥劑圖取	
藥劑圖取	

系統會一併顯示含混合劑的產品

特瑪利 防治對象: 十字花科蔬菜

藥劑名稱	作用機制代碼	每公頃劑量(公升)	噴霧次數(次)	噴霧方法	注意事項
特瑪利	FRAC 1	0.50-1	3-1000	忌用噴水機噴霧。忌用噴霧機噴霧。忌用噴霧機噴霧。	1. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。 2. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。

點擊可進入防治對象頁面

共同防治

混種作物共同防治藥劑篩選

害物	夜蛾
作物	白菜 芹菜 白菜

01

搜尋 輸入藥劑名稱, 按下搜尋

02

找出混種蔬菜可以同時噴的藥

特瑪利 防治對象: 十字花科蔬菜

藥劑名稱	作用機制代碼	每公頃劑量(公升)	噴霧次數(次)	噴霧方法	注意事項
特瑪利	FRAC 1	0.50-1	3-1000	忌用噴水機噴霧。忌用噴霧機噴霧。忌用噴霧機噴霧。	1. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。 2. 噴霧時宜先將藥劑充分攪拌。

03

列印本頁資料(下載word檔)